

ガリウムシンチグラム

* お注射や検査の15分前までに、地下2階の核医学検査室へお越し下さい。

検査目的 方法

- 検査予定日の2、3日前に当院で注射をします。
- 静脈から放射性同位元素を注入し、各目的臓器に集積する量を測定する検査です。
放射性同位元素を注射して検査を行いますが、非常に微量なため副作用はほとんどありません。
- 検査の前処置として検査の前に下剤をお飲みいただき、なるべく完全に排便してきて下さい。
(腸管内生理的集積の影響を除去するためです。)

注意事項

- 注射日に他に診察・検査がない場合は再来機を通らずに地下2階の核医学検査室に直接お越し下さい。
初診の場合は初診受付までお越し下さい。
- 検査当日は1階自動再来機で診察券にて受付をされた上で、地下2階核医学検査室へお越し下さい。
- 注腸食を病院2階の売店にて購入して下さい。
- 食事制限があります。詳しくは別紙をご覧ください。
- 検査日と注射日が異なりますのでご注意下さい。
- 注射をした日から2～3日後、検査予定日時に約60分間検査を行います。

※高価なお薬を使いますので、キャンセルする場合は
2日前までにお願いします。

※予約変更・キャンセルの場合は紹介元医療機関へご連絡ください。

※当日予約時間に遅れますと検査が出来なくなることがあります。

遅れる場合や、キャンセルの場合は下記に必ずご連絡下さい。

連絡先 : 03-5791-6135 (医療連携室直通)